

معدلات و توقيتات الإستخدام :

نوع الأعشاب	طور الأعشاب	معدل الاستعمال
الأعشاب الرقيقة الحولية	٢-٤ أوراق وحتى الإزهار ٤-٥ إسطوانات وما فوق	١.٢٥-٠.٥ لتر / هكتار ١.٧٥-٠.١ لتر / هكتار
الأعشاب الرقيقة المعمرة	٢-٤ أوراق وحتى الإزهار ٤-٥ إسطوانات وما فوق	٢.٥-٠.٢ لتر / هكتار ٣.٥-٠.٢ لتر / هكتار الاعتماد المحلي ٢.٥ لتر/ هكتار لمكافحة عشبة الرذيين

* التصنيف السمي حسب WHO: III خفيف السمية

فترة الأمان :

٦٠ يوم على الشوندر والجزر والبندورة والخيار، ٧٥ يوم على البصل والبطاطا وفول الصويا، ٤٥ يوم أشجار مثمرة والحمضيات.

الإحتياطات :

- يجب ارتداء الألبسة الواقية عند القيام بعملية الرش.
- تجنب إيصال سائل الرش الى العيون والجلد، وتجنب استنشاق رذاذ الرش.
- لا تلوث مصادر المياه.
- العبوات الفارغة يجب غسلها ثلاث مرات ثم إتلافها.
- احفظ المبيد في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق بعيداً عن أماكن الأغذية وعلف الحيوانات وبعيداً عن متناول الأطفال.

الإسعافات الأولية :

- في حال استنشاق بخار المبيد أو رذاذ الرش ينقل المصاب الى الهواء الطلق ويعطى تنفس اصطناعي ويستدعى الطبيب.
- في حال ملامسة الجلد تزال الألبسة الملوثة ويغسل الجلد مباشرة بالماء والصابون ويستدعى الطبيب.
- في حال ملامسة العيون تغسل مباشرة بكمية وافرة من الماء ولمدة 15 دقيقة ويستدعى الطبيب.
- في حال ابتلاع المبيد يعطى المصاب كأسين من الماء، لا تحرض على الإقياء واتصل بالطبيب مباشرة.
- * في حال حدوث أي تسمم يجب الإتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات السمية في محافظتكم.

مضاد التسمم :

لا يوجد مضاد خاص، يمكن إجراء غسيل للمعدة وتعالج الأعراض.



مركز قابل للإستعلاج

المادة الفعالة : Active Ingredient: Quizalofop-P-Ethyl 5%
الجمموعة الكيميائية : Aryloxyphenoxypionate
الاسم الكيميائي : حسب (IUPAC)

Chemical Name: Ethyl (R)- 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-ylloxy) phenoxy] propionate

العبوة : 1 لتر
رقم الدفعة :
تاريخ الصنع :
تاريخ انتهاء الصلاحية : ثلاث سنوات من تاريخ الصنع
Expiry Date: 3 years from Production Date

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحت رقم ٢٨/١ تاريخ ٢٠٠٢/١٠/١

اعتمدت للصاق بمديرية وقاية المزروعات تحت رقم H/21/1 تاريخ ٢٠٠٨/١/٢٧

المادة الفعالة انتاج شركة نيسان كيميكال - اليابان
المستحضر التجاري انتاج شركة شيماك أغريفار - بلجيكا

تسويق شركة أريستا - اليابان
استيراد شركة التنمية الزراعية - خوري وشريكه

دمشق هـ ٤٤٤٢٥٣ - حماه هـ ٤٠٢١١٤
حلب هـ ٢٢٧٩٥٥٠ - طرطوس هـ ٣٢٦٢١٠

الخصائص البيولوجية : تارجا سوبر مبيد أعشاب رقيقة يستخدم بعد الانبات لمكافحة الأعشاب رقيقة الأوراق الحولية والمعمرة التي تنبت في حقول الشوندر السكري، الجزر، البصل، القطن، البطاطا، البندورة وغيرها من محاصيل الخضار عريضة الأوراق. كما يستخدم لمكافحة الأعشاب رقيقة الأوراق في بساتين الأشجار المثمرة.

مميزات المبيد :

- تارجا سوبر المبيد الأحدث لمكافحة الأعشاب الرقيقة.
- يعتبر تارجا سوبر من أكثر المبيدات فعالية في مكافحة الأعشاب التالية: النجيل الزاحف، ذيل الثعلب، الشوفان البري، النجيل العادي، الرذيين، الشعير البري، زوان (لوليوم)، ذنب الحشيشة الحمراء، ذيل الثعلب الأخضر والحليان.
- يمتص المبيد بسرعة من خلال الأوراق (بعد عدة ساعات من الرش) وينتقل جهازيا داخل الأعشاب الضارة خلال يوم واحد.
- تارجا سوبر مقاوم للإنجسال بالمطر حتى بعد ساعة واحدة من الرش.
- يمتاز المبيد بسرعة فعالية حيث تقتل الأعشاب الضارة بعد ٧-١٠ أيام من الرش.
- المبيد آمن على البيئة ولا يسبب أي أضرار على الحياة البرية.
- في حالة بعض الأنواع المعمرة (ذات الريزومات) مثل النجيل الزاحف والحليان يمتاز المبيد بأنه يصل الى هذه الريزومات بسبب جهازيته العالية ويفضي عليها ويمنعها من الإنبات.
- يمتاز المبيد بكفاءته العالية بمكافحة النجيليات ((سميط الحطيط)) التي تنبت في المحاصيل عريضة الأوراق.
- حجم سائل الرش :** ٢٠٠ - ٥٠٠ لتر/هكتار
- السمية النباتية :** المبيد آمن وانتخاني على المحاصيل العريضة الأوراق ولا يسبب أي ضرر عند مراعاة نصائح ومعدلات الاستخدام، ويمكن استخدامه في جميع مراحل نمو المحصول دون أي ضرر.

قابلية الخلط :

يمكن خلطه مع مبيدات الأعشاب عريضة الأوراق، ومع المواد اللاصقة الناشرة غير الأيونية.

السمية :

الجرعة النصفية القاتلة

LD 50 للجرذ عن طريق الفم ٢٥٥١ ملغ/كغ

LD 50 للجرذ عن طريق الجلد ٢٠٠٠ ملغ/كغ

المبيد غير سام عمليا للنحل والطيور، شديد السمية للأسماك.



Caution

