



SY.06092283C
(140x85x225)0028



الخصائص البيولوجية :
مبيد فطري جهازى متخصص في مكافحة الأمراض الفطرية و اللفحة النارية (البكتيرية) على الأشجار المثمرة . الحمضيات . الفريز و نباتات الزينة .
- ألبيت أول مبيد فطري جهازى يمتص بواسطة النباتات و يتجه إلى أعلى و أسفل النبات .
- يمتص المبيد بسرعة إلى داخل أنسجة النبات و بذلك تقل فرصة غسله بواسطة الأمطار أو مياه الري .
- يتأخر ألبيت بطول فترة بقائه فعلاً من عدة أسابيع إلى عدة شهور حسب نوع المحصول و بذلك يقلل من عدد مرات الرش عند مقارنته بالمبيدات الفطرية الأخرى .
- ألبيت المبيد الفطري الوحيد الذى يمتلك تأثير جهازى إلى أسفل و بذلك يمكن رشه على المجموع الخضري لمنع الإصابة بالفيتوفتورا على الجذع و الجذور .
- يمكن استعماله بأمان حيث أنه قليل السمية للإنسان و الحيوان و لا يحدث ضرراً للنبات .
فترة ما قبل الجني : ٧ أيام قبل جني المحصول
السمية : الجرعة السامة للجرذ عن طريق الفم ٥٨٠٠ ملغ /كغ و عن طريق الجلد للأرانب أكثر من ٢٠٠٠ ملغ/ كغ
التصنيف السمي حسب WHO : III + من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها
* في حال حدوث أي تسمم الاتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات السمية في محافظتكم .
الاستعمال و نسب الاستعمال :

المحصول	المرض	معدل الإستخدام
الخيار و الفرعيات	البياض الزغبى	٣٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء الرشة الأولى عندما تكون الظروف مشجعة للمرض و يكرر كل ٧ - ٤ ايوم حسب شدة الإصابة .
البصل	البياض الزغبى	٢٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء الرشة الأولى عندما تكون الظروف مشجعة للمرض و يكرر حسب الحاجة .
البندورة	تعفن الجذور	٢٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء الرشة الأولى بعد التشثيل مباشرة و الثانية بعد ٧ - ٤ يوم من الأولى .
الحس	البياض الزغبى	٢٨٠ غ / ١٠٠ لتر ماء

كما يستخدم على الحمضيات و الفريز و نباتات الزينة وفق ما يلي :
يستعمل كمبيد وقائي و علاجي في مكافحة العديد من الأمراض الفطرية على المحاصيل المختلفة .
الحمضيات : يستعمل لمكافحة مرض التصمغ رشاً على الأوراق بمعدل ٢٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء . و بمعدل أربع مرات بالسنة أما في حال قروح و جروح فدهن منطقة الجروح بعد كشط مكان الإصابة بمعدل ١٠٠ - ٢٥٠ غ / لتر و يعاد الدهن مرة بالشهر ثم يستأنف الرش على الأوراق .
مشاتل أشجار الحمضيات : يستعمل لمكافحة أمراض الذبول بالرش بمعدل ٤٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .
معالجة الأوراق : يتم رش الأوراق مباشرة بعد الزراعة بمعدل ٤٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء ثم أثناء فترة النمو ترش النباتات بمعدل ٢٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء ثلاث مرات في فصل الخريف و مرة واحدة في الربيع .
مكافحة العفن الأحمر : ترش النباتات خلال فترة النمو بمعدل ٣٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء مرة كل شهر
نباتات الزينة و الأزهار : يستعمل لمكافحة أمراض العفن وفق ما يلي :
- تغطس نباتات أزهار القطف قبل التشثيل لمدة ١٥ إلى ٣٠ دقيقة في خليط يحتوي ٥ إلى ١٠ غ / لتر ألبيت .
- تبليل التربة (عادة كل شهر مرة) بمعدل ٥ - ١٠ غ / لتر ألبيت .
- الرش (مرة إلى مرتين شهرياً) بخليلط يحتوي على ٢ - ٥ غ / لتر ألبيت .
عندما يستعمل المبيد وفق النسب الموصى بها فهو آمن للحيوانات الأليفة و السمك .



المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعى
تحت رقم ٢٥/١ أمراض - بتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٤
إعتمدت للصاقفة مديرية وقاية النبات
تحت رقم F/5/2 بتاريخ ٢٠٠٨/١/٣٠
إستيراد شركة التنمية الزراعية "خورى و شريكه"
Attanmiah Agricultural Co., (Khouri & Co.)
دمشق هاتف : ٤٤٤٤٢٥٣ - حماء هاتف: ٤٠٢١١٤
حلب هاتف: ٢٢٧٩٥٥٠ - طرطوس: ٣٢٦٢١٠

العبوة : ١ كغ
تاريخ الصنع :
تاريخ إنتهاء الفعالية : سنتان من تاريخ الصنع
Expiry Date : Two years from the pro. date
Batch No. :



الإسعافات الأولية :
- لا يوجد للمبيد أي تأثيرات ضارة على الصحة فيما لو استخدم حسب التعليمات الموصى بها وفي الظروف العادية .
أما ابتلاع المبيد فقد يسبب إسهال - غثيان - تشنجات و اقياء .
- في حال تلوث العين يجب غسلها بكمية كبيرة من الماء ولدة ١٥ دقيقة ثم يستدعى الطبيب .
- في حال تلوث الجلد يجب غسل المنطقة الملوثة بكمية كبيرة من الماء .
- في حال ابتلاع المبيد يجب على المصاب شرب كمية كبيرة من الماء أو الحليب و عدم خريض الأقياء ثم يستدعى الطبيب
في حال ابتلاع المبيد أو حدوث تسمم يجب مراجعة الطبيب . ليس للمبيد مضاد خاص به و تعالج الأعراض .
الاحتياطات :
يجب أخذ جميع الاحتياطات الضرورية عند استخدامه كسائر المبيدات الأخرى و خاشعي وصول المبيد أو زداده إلى مصادر المياه أو المواد الغذائية .
يجب عدم قطف الثمار أو جمع النباتات قبل مرور فترة الأمان المعمول بها .
* يجب حفظ المبيد في مكان آمن و بعيداً عن متناول الأطفال .
التخزين :
يحفظ في مكان جاف و بارد بعيداً عن مصادر الحرارة و متناول الأطفال .
قابلية المزج :
ألبيت قابل للمزج مع معظم المبيدات الزراعية المعروفة لكن لا ينصح بمزجه مع المغذيات أو الأسمدة الورقية و المنتجات التي تحتوي على مادة النحاس .
وكذلك لا يجب استخدامه مع المركبات الزيتية .
ملاحظة : خفيف السمية للنحل والطيور والأسمك .

Bayer CropScience Cyprus Office	Created by : A. Mahmoud	
	Code Files for Server : 06092283C	
Date : 14.02.2008 Dimensions: 140x85x225 mm	File reference : SY.06092283C(140x85x225)0028	
	Loaded by: A. Mahmoud	
Finish - File	Illustrator CS3	CMYK