

معدلات الاستخدام :

المحصل	المرض	معدل الاستخدام لتر/هـ
الحمص - العنبر	لفحة أسكوكيتا، العفن الرمادي	٣
البازلاء - الفول القرعيات البندورة	لفحة سبتوريا ، أنترالكونز البياض الزغبي اللفحة المبكرة، العفن الرمادي كلادوسپوريوم	٣
البطاطا	اللفحة المتأخرة	٣
البصل	البياض الزغبي، العفن الرمادي	٣
التفاحيات	جرب التفاح	٣
اللوزيات (الدراق)	تجدد تافرييا، لفة الأزهار	٣ لتر/هكتار أو ٣٥٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء
العنب	البياض الزغبي	٣
الخس	البياض الزغبي	٣

السمية النباتية :

قد يحدث سمية نباتية فقط عند خلطه مع زيوت الرش أو المواد التي تحتوي في تركيبها على الزيوت

فترة ما قبل الجني :

٧ أيام على البقوليات ، القرعيات ، البندورة ، البطاطا و الخس

١٤ يوم على البصل

٢١ يوم على الأشجار المثمرة و العنب

السمية :

الجرعة النصفية القاتلة للجرذ هي :

LD 50 عن طريق الجلد < ٢٠٠٠ ملغ/كغ

LD 50 عن طريق الفم < ٢٠٠٠ ملغ/كغ

المبيد غير سام نسبيا للنحل ، متوسط السمية للطيور شديد السمية للأسماك

* التصنيف السمي حسب WHO : III خفيف السمية .

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية شائعة الاستخدام ، لا يخلط مع الزيوت و بشكل عام يفضل اجراء تجربة خلط على نطاق ضيق قبل عملية الرش الأساسية

بانكو

BANKO 500 SC®

مبيد فطري

الاسم التجاري و الشكل : بانكو - معلق مركز

المادة الفعالة : ٥٠٠ غ/لتر كلوروثالونيل

Active Ingredient: Chlorothalonil

المجموعة الكيميائية : Chloronitrile

الاسم الكيميائي حسب IUPAC :

Chemical Name: Tetra Chloroiso
phthalonitrile

الخصائص البيولوجية : بانكو مبيد فطري وقائي - غير

جهاز ي يستخدم لمكافحة مجموعة كبيرة من الأمراض

الفطرية على المحاصيل المختلفة .

BANKO 500®

BANKO 500®

عوامل الأمان و الاحتياطات الواجب اتباعها عند الاستخدام :

- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال .
- يحفظ بعيدا عن أماكن الأغذية و علف الحيوانات و مصادر المياه
- يجب عدم اتصال سائل الرش الى العيون ، الجلد و الملابس
- يجب ارتداء الالبسة الواقية عند القيام بعملية الرش .
- تجنب استنشاق رذاذ الرش .
- يجب مراعاة نصح و معدلات الاستخدام .
- يجب غسل الأيدي بالماء و الصابون مباشرة بعد الانتهاء من الرش
- إتلاف الحيوانات :

- ١ أفرغ العبوات كلياً و اغسلها بالماء ثلاث مرات و اضع محلول الغسيل الى خزان الرش .
- ٢ تنقّب العبوات الفارغة و تدفن في حفرة مخصصة لذلك بعيدا عن مصادر المياه الجوفية
- ٣ لا تستخدم العبوات الفارغة لاي غرض كان .

الإسعافات الأولية :

- ينقل المصاب من منطقة التلوث الى الهواء الطلق ، يجب حماية المصاب من البرد لا تعرض على الأقدام و انما استدعى الطبيب و اعرض عليه لصق المبيد .
- في حال استنشاق رذاذ الرش ، ينقل المصاب الى الهواء الطلق و يجري له تنفس اصطناعي عند الضرورة .
- في حال تلوث الجلد ، تزال الملابس الملوثة و يغسل الجلد بالماء و الصابون لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة

- في حال تلوث العيون : تغسل مباشرة بكمية كبيرة من الماء و لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة .
- في حال ابتلاع المبيد : يجري غسل للمعدة ، يراقب ضغط الدم و يعطى المصاب اوكسجين لتنظيم التنفس
- و يجب ان يتم ذلك من قبل اناس مختصين .
- في حال حدوث تسمم الإتصال بأقرب مركز وطني لمعلومات السمية في محافظتكم .

مضاد التسمم : لا يوجد مضاد خاص و انما تعالج الأعراض

العبوة ١ لتر Pack 1 Lt.

رقم الدفعة : Batch No. :
تاريخ الصنع : Production Date :

تاريخ انتهاء الصلاحية : ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج
Expiry Date: 3 years from the production date.

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي تحت

رقم ٥٨/٤ أمراض تاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٣

اعتمدت للصق بمديرية وقاية النبات تحت رقم

تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٨ F/43/4
انتاج شركة أريستا لايف ساينس - فرنسا


Arysta LifeScience - France
استيراد شركة التنمية الزراعية

دمشق هـ ٢٥٣٤٤٤ - حماه هـ ٨٨٦٨٤
طرطوس هـ ٢٢٦٢١ - حلب هـ ٢٢٧٥٥
Website: www.attanmah.com
E-Mail: info@attanmah.com

Net content 1 L

Arysta LifeScience

Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix - B. P.80
64150 NOGUERES (France)
Tel. : 33 5 59 60 92 92
Fax : 33 5 59 60 92 99
http://www.arysta-eame.com



CAUTION



7SY1001-0001

15Y0501-0001

MERCI DE VALIDER CE BAT SOUS 72 HEURES

	DATE : 24/02/11	RÉF. FICHER : 109056_B3	OPÉRATEUR : AV
	CLIENT : Arysta	MODÈLE : Banko 500 SC - Syrie - 1 L	BON À TIRER N° : 2
N° OF. : 415445	CORRESPONDANT CLIENT : Y. Diris	FORMAT : 145x280	
COULEURS :		<h2>APPROUVÉ</h2> <p>Par DIRIS , 11:39, 25/02/2011</p>	
Tél. direct pao : 05 59 06 89 03		Fax g	
<h3>MERCI DE BIEN CONTRÔLER CE BON À TIRER, SON ACCEPTATION ENGAGE VOTRE RESPONSABILITÉ</h3>			

EN IMAQ 002 - Edition 6 - 15/04/09

109056_J10