

معدلات الاستخدام:

المحصول	معدل الاستخدام
الخضار	٢٠٠-٤٠٠ غرام/١٠٠ لتر ماء
أشجار الفاكهة	٣٠٠-٧٠٠ غرام/١٠٠ لتر ماء
المحاصيل الحقلية	٢٠٠-٥٠٠ غرام/١٠٠ لتر ماء
نباتات الزينة	٢٠٠-٣٠٠ غرام/١٠٠ لتر ماء

تستعمل المعدلات المنخفضة لمعالجة أمراض البياض الدقيقي وبدايات الإصابة.

والمعدلات المرتفعة لمعالجة العناكب والإصابات الشديدة.

فترة الأمان:

الخضار: ٣-٥ أيام، أشجار الفاكهة: ٥-١٠ أيام، الكرم: ١٥ يوم، المحاصيل: ١٠-١٥ يوم.

احتياطات الاستخدام:

١- يجب إرتداء الألبسة الواقية أثناء عملية الرش (قفازات - قناع - بنطال طويل - نظارات) .

٢- لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء الرش.

٣- بعد الإنتهاء من عملية الرش يجب غسل الأيدي والوجه والجلد بشكل كامل وبكمية كبيرة من الماء وكذلك غسل الألبسة الواقية، يجب إتلاف العبوات الفارغة.

٤- لا تلوث مصادر المياه، ابق المبيد بعيداً عن متناول الأطفال والمواد الغذائية والأعلاف.

إجراء عملية الخلط: أضف كمية تعادل ثلث خزان الرش من الماء ثم الكمية المحددة من المبيد، حرك حتى يصبح المزيج متجانس ثم أكمل خزان الرش بالماء مع التحريك المستمر.

العبوة : ١ كغ

رقم الدفعة:

تاريخ الانتاج :

تاريخ انتهاء الصلاحية: ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

تحت رقم ٤٣/١٨ أمراض تاريخ ١٤/٥/٢٠١٤

اعتمدت اللصاقة بمديرية وقاية النبات تحت رقم F/51/35 تاريخ ١١/٥/٢٠١٤



إنتاج شركة كويمتال - تشيلي

استيراد شركة التنمية الزراعية

دمشق: ٤٤٤٢٥٣ - حماة: ٤٤٨٨٦٨٠ - حلب: ٢٦٦٨١٤٩ - طرطوس: ٣٢٦٢١٠

Website: www.attanmiah.com E-mail: info@attanmiah.com

الاسعافات الأولية

ومضاد التسمم:

- عند حدوث التسمم أو إصابة يجب استدعاء الطبيب فوراً والقيام بمساعدة المصاب على التقيؤ ونزع ملابسه وغسل جسمه بالماء والصابون ووضعه في الهواء الطلق، وإجراء التنفس الصناعي عند اللزوم.

- في حال التسمم الإتصال بأقرب مركز لمعلومات السمية في محافظتكم.

- يعطى المصاب كربون طبي كفسيل معدي ومسهلات ملحية كسلفات الصوديوم ٢٠-٣٠ غرام مع سوائل معوضة.

السمية النباتية

(الأمان على المحاصيل):

معظم النباتات ذات قدرة تحمل جيدة للمبيد إذا استعمل حسب المعدل المنصوح به باستثناء بعض أصناف الإجاص والتفاح والكرمة والليمون والمشمش والكوسا وينصح بإجراء اختبار محدود للحساسية.

الخزن والصلاحيه:

يجب أن يحفظ المبيد في عبوته الأصلية وفي أماكن جافة وباردة وجيدة التهوية وغير معرضة لأشعة الشمس المباشرة ويكون فعالاً وأمناً في هذه الظروف.

ديفيندر

DEFENDER WG

مبيد فطري - كبريت

حبيبات قابلة للانتشار

الشركة المنتجة: شركة كويميتال - التشيلي

الاسم التجاري: ديفيندر

الشكل : حبيبات قابلة للانتشار WG

Active ingredient: Sulfur 80%

Chemical name (IUPAC): Sulfur

Chemical Group: Inorganic

المادة الفعالة : ٨٠% كبريت ميكروني

الاسم الكيميائي حسب IUPAC:

المجموعة الكيميائية: غير عضوي

الخصائص: مبيد فطري ذو فعالية عالية في الوقاية ومكافحة العديد من أمراض البياض الدقيقي والعناكب والحلم التي تصيب الخضروات والأشجار والمحاصيل ونباتات الزينة.

ديفيندر على شكل حبيبات قابلة للانتشار والتي توفر زيادة الالتصاق على النبات ومنع غسل المادة بالأمطار وزيادة ذوبان المادة في الماء إضافة إلى التخلص من ظاهرة التجبل.

كما أن الكبريت عنصر يساعد في عملية التمثيل الضوئي داخل النبات.

السمية: الجرعة النصفية القاتلة للجرذ عن طريق الفم LD50 هي ١٢٠٠٠ ملغ / كلغ.

عن طريق الجلد LD50 أكثر من ٥٠٠٠ ملغ / كلغ.

التصنيف السمي حسب WHO: III+ من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها.

المبيد سام للأسماك والنحل وخفيف السمية للطيور ولا يرش في المناطق التي توجد فيها خلايا نحل.



إتلاف العبوات:

١- اغسل العبوة ثلاث مرات بالماء التنظيف وأضف ماء الغسيل إلى خزان الرش.

٢- تخلص من العبوات الفارغة بتقطيعها ودفنها في مكان مخصص بعيداً عن مصادر المياه الجوفية.

٣- لا تستخدم العبوات الفارغة لأي غرض كان.

٤- احفظ بقايا المبيد غير المستعمل في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق في مكان أمين بعيداً عن متناول الأطفال والمواد الغذائية والأعلاف.

مسؤولية مستخدم المادة:

تخلي الشركة الصانعة والمستوردة مسؤوليتها في حال الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال أو سوء التخزين أو عدم اتباع التعليمات والتوصيات، ويتحمل مستخدم المادة مسؤولية أية أضرار قد تحدث.

قابلية الخلط:

يمكن خلط ديفيندر مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية المعروفة قيد الاستعمال باستثناء المواد ذات التفاعلات القلوية العالية أو ذات الأساس الزئبقي أو المساحيق المستحلبة كزيوت الرش، ويفضل إجراء تجربة مزج، لا يخلط مع الزيوت ولا يرش قبلها أو بعدها.