Cuprocaffaro® Blue W.P.

كوبروكافارو (أزرق)

مبيد فطري نحاسي معدني

الاسم التجاري والشكل : كوبروكافارو ، بودرة قابلة للبلل

المادة الفعالة : 85 % أوكسي كلور النحاس Active Ingredient : 85% Copper Oxichloride

(ما يعادل 500 غ/كغ نحاس معدني)

الإسم الكيماوي: (IUPAC): Dicopperchloride trihydroxide Chemical name:

كوبروكافارو مبيد فطري واسع الطيف على شكل مسحوق قابل للبلل بالماء ، يستعمل للوقاية من مجموعة كبيرة من الأمراض منها : البياض الزغبي على الكرمة، الجرب على التفاحيات، تجعد أوراق الدراق، و الكوردنيوم

و التقرحات على أغصان اللوزيات، عين الطاووس و تعفن الزيتون، التصمغ البني، العفن البني، و اللفحة البكتيرية على الحمضيات، تبقع أوراق الشوندر السكري، البياض الزغبي و تبقع الأوراق و اللفحات على البطاطا و البندورة و الفرعيات، فستق السوداني، فول الصويا.

ملاحظة : عند الرش يراعى تغطية كامل أجزاء المجموع الخضري تجنب الرش بواسطة الطائرات.

السمية النباتية :

تجنب استعماله في فترة الإزهار

- تجنب استعماله على الدراق و الخوخ و بعض أصناف التفاح و الأجاص أثناء فترة النمو الخضري خلال فترة الربيع و الصيف.

الاحتياطات :

- تجنب الأكل والشرب و التدخين أثناء الرش
- تجنب ملامسة المادة للأطعمة و الأعلاف و مصادر المياه
- تجنب رش المادة عكس اتجاه الريح
- احفظ المادة في عبوتها الأصلية مغلقة بإحكام
- ارتد الملابس الواقية (قفازات،كمامة.. الخ) و تجنب ملامسة المادة للجلد و الأعين و الثياب
- عند انتهاء استخدام المادة، اغسل الأيدي و الجلد و الوجه و الثياب بالماء و الصابون عدة مرات.

الإسعافات الأولية:

في حال ابتلاع المادة :

* حرض الأقياء بإعطاء المصاب مادة مقيئة
* امنع إصابة المصاب بالجفاف وتجنب إعطاءه أي نوع من الكحول أو الدسم أو الزيوت.
* أنقل المصاب إلى المشفى في حالات التسمم الحادة .
* في حال ملامسة العين اغسل العين الملوثة بوافر من الماء النظيف لمدة 15 دقيقة.
* في حال ملامسة الجلد

اغسل المنطقة الملوثة بكثير من الماء والصابون .

اتلاف العبوات:

1. اغسل العبوة ثلاث مرات بالماء النظيف وأضف ماء الغسيل إلى خزان الرش.
2. تخلص من العبوات الفارغة بتفليعها ودفنها في مكان مخصص بعيدا عن مصادر المياه الجوفية.
3. لا تستخدم العبوات الفارغة لأي غرض كان.
4. احفظ بقايا المبيد غير المستعمل في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق في مكان أمين بعيدا عن متناول الأطفال والمواد الغذائية والأعلاف.

ISAGRO
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

B2130603/1

نسبة الاستعمال

المحصول	الأمراض		نسبة الاستعمال
البندورة ، الباذنجان الظليلة	اللفحة المبكرة والمتأخرة، التبقع السبتوري،الترانكوز		5. كغ / هكتار
	فوموبسيس(لفحة الأغصان) ، اللفحة البكتيرية (كوريناكتيروم ، كزانثوموناس ، بسيدوموناس)		5. كغ / هكتار
البطاطا ، البطاطا الحلوة	اللفحة المبكرة والمتأخرة ، لفحة الساق الأسود البكتيرية		5. 3 كغ / هكتار
الكرمة	البياض الزغبي،الترانكوز،فوموبسيس، تبقع الأوراق،اللفحة البكتيرية		350 غ/100 لتر ماء
التفاحيات	جرب التفاح	الرشة الشتوية	500 غ/100 لتر ماء
		الرشة الصيفية	250 غ/100 لتر ماء
	جرب الأجاص	الرشة الشتوية	500 غ/100 لتر ماء
	اللفحة النارية (إيروينيا)		375 غ/100 لتر ماء
	اللفحة البكتيرية		350 غ/100 لتر ماء
اللوزيات،الدراق ، نكتارين ، خوخ كرز، مشمش ، لوز	تجعد أوراق الدراق (تافرينا)	الرشة الشتوية	800 غ/100 لتر ماء
		الرشة الصيفية	400 غ /100 لتر ماء
	مونيليا	الرشة الشتوية	600 غ /100 لتر ماء
	الثقب الخرقي(كوريناوم)	الرشة الشتوية	600 غ /100 لتر ماء
		الرشة الصيفية	310 غ/100 لتر ماء
	الصدأ	الرشة الشتوية	600 غ /100 لتر ماء
		الرشة الصيفية	300 غ /100 لتر ماء
	تبقع أوراق الكرز	الرشة الشتوية	600 غ /100 لتر ماء
		الرشة الصيفية	300 غ /100 لتر ماء
	موت البراعم البكتيري(بسيدوموناس)	الرشة الشتوية	600 غ/100 لتر ماء
		الرشة الصيفية	310 غ/100 لتر ماء
	التبقع البكتيري	الرشة الشتوية	400 غ /100 لتر ماء
		الرشة الصيفية	225 غ/100 لتر ماء
الزيتون	العفن الهبابي،سيكلوكونيوم،اللفحة البكتيرية(بسيدوموناس)		400 غ /100 لتر ماء
	عين الطاووس		250 غ/100 لتر ماء
الجوز	التبقع الأسود البكتيري (كزانثوموناس)		400 غ /100 لتر ماء
الحمضيات : الليمون الحامض ، البرتقال، الأفندي كريفون	ميلانوز(فوموبسيس)، جرب الحمضيات، التصمغ البني، تبقع الثمار		350 غ/100 لتر ماء
	الترانكوز		400 غ /100 لتر ماء
	التقرح البكتيري (كزانثوموناس شبري)		600 غ /100 لتر ماء

فترة ما قبل الجني :

*** اللوزيات ، التفاحيات ، الحمضيات والخضار الورقية 14 يوم**

*** باقي الخضار والكرمة المعدة للمائدة 3 ايام**

*** الكرمة المعدة للخمور 21 يوم**

قابلية الخلط : يمكن خلطه مع الزيت الشتوي كما يخلط مع معظم المبيدات المستخدمة في الزراعة.

- **في حال حدوث تسمم الإتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات السمية في محافظتكم .**

السمية : LD 50 لأنثى الجرذ عن طريق الفم 2364 ملغ/كغ
وللأرانب عن طريق الجلد أكثر من 2000 ملغ/كغ

السمية للنحل والطيور والأسماك : خفيف السمية للنحل والطيور ، سام للأسماك .
التصنيف السمي حسب WHO : + III من غير المحتمل حدوث تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها

مضاد التسمم : لا يوجد مضاد تسمم ، المعالجة حسب الأعراض
أحفظ المادة بعيداً عن متناول الأيدي والأطفال وفي مكان بارد وجاف .

العبوة : 1 كغ — **Pack.: 1 Kg**
رقم الدفعة : — **Batch No.: see above**
تاريخ الصنع : — **Production date : see above**
تاريخ انتهاء الفعالية : ثلاث سنوات من تاريخ الصنع — **Expiry date: 3 years from the Pro. Date**

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت رقم 18 / 20 أمراض تاريخ 2007/10/24
اعتمدت للصالحة بمديرية وقاية النبات تحت رقم F/52/1 تاريخ 10 / 11 / 2009

انتاج شركة ايســاغرو - ايطاليــا
PRODUCER ISAGRO S.P.A - ITALY
استيراد شركة التنمية الزراعية
دمشق هـ 4444253 – حماه هـ 488680 – حلب هـ 2279550 – طرطوس هـ 326210

Website: www.attanmiah.com
E-Mail: info@attanmiah.com

REV 20111012