





كونسيننتو

450 SC

معلق مركز

20x500ml



كونسيننتو

450 SC

معلق مركز

Fungicide

Article-Nr.

84099333

20x500ml



Caution

تحذير



 Bayer CropScience Cyprus Office	Created by : A. Mahmoud Code Files for Server : 84065110A File reference : SY.84065110A(403x175mm) Loaded by: A. Mahmoud
Date : 13.10.2014 Dimensions: 403x175mm	
Finish - File	Illustrator CS6 CMYK



الخصائص البيولوجية :
كونسيننتو مبيد فطري جديد خليط من مادتين فعاليتين يستخدم لمكافحة أمراض اللفحات والبيض الزغبي على الخضار والمحاصيل المختلفة.
كونسيننتو مطّور بشكل خليط مدروس ليعزز فعالية كل واحدة من المواد الفعّالة بما يؤمن :
- تأثير وقائي ومستوى عالي .
- تأثير جهازى واختراقى ممتاز يؤمن حماية الثموات الجديدة (السوق والأوراق)، وكذلك التأثير العلاجي القوي للمبيد ومقاومة الإنغسال بمياه الأمطار .
طريقة التأثير : كل مادة من المادتين الفعّالتين لها طريقة تأثير مختلفة عن الأخرى .
• **مادة فيناميدون :** توقف عملية التنفس في الميتوكوندريا وتؤثر في الفطر عبر عدة مراحل من دورة حياته فهي تمنع خبز الأبواغ البيضية وكذلك تمنع إنبات الأبواغ القطرية كما أنها وبسبب تأثيرها الإختراقي تمنع إنتاج الأبواغ .
• **مادة بروپاموكارب :** تؤثر أيضاً في عدة مراحل من تطور الفطر حيث تعيق تركيب الفوسفوليبيدات والأحماض الدهنية مما يؤدي إلى تخریب الأغشية الخلوية. هذا التأثير ينعكس على الفطر في وقف نمو المشيعة الخلوية وإنتاج وإنبات الأبواغ .
نصائح و معدلات الإستخدام :

الحصول	المرض	معدل الإستخدام / هـ	فترة ماقبل الجني
البطاطا	اللفحة المبكرة Alternaria Solani اللفحة المتأخرة Phytophthora infestans	٢ لتر	٧ أيام
البندورة	اللفحة المبكرة Alternaria Solani اللفحة المتأخرة Phytophthora infestans	٢ لتر	٧ أيام
الخس	البيض الزغبي Bremia Lactuca	١,٥ - ٢ لتر	٧ أيام
القرعيات	البيض الزغبي Pseudoperonospora Cubenis	٢ - ٢,٥ لتر	٧ أيام
البصل	البيض الزغبي Peronospora Destructor	٢ - ٢,٥ لتر	٧ أيام
التبغ	البيض الزغبي Peronospora Tabacina	٢ - ٢,٥ لتر	٧ أيام
نباتات الزينة	عفن الجذور والساق Phytophthora SPP Pythium SPP	٢ - ٢,٥ لتر	-

السمية النباتية : لا يوجد للمبيد أية تأثيرات سلبية على المحاصيل المنصوح بإستخدامه عليها شريطة مراعاة كافة نصائح ومعدلات الإستخدام.
قابلية الخلط : كونسيننتو قابل للخلط مع العديد من المبيدات الفطرية والحشرية الأخرى وعلى أية حال تجنّب الخلط مع المركبات القلوية . قبل خضبر أي خليط تأكد من النصائح الموجودة على لصاقة المواد المراد خلطها وقم بتجربة الخليط على جزء من الحقل قبل رش كامل النباتات .
التصنيف السمي حسب WHO : III خفيف السمية
السمية : الجرعة النصفية القاتلة للجرذ :
LD 50 عن طريق الفم أكثر من ٢٠٠٠ ملغ / كغ .
LD 50 عن طريق الجلد أكثر من ٢٠٠٠ ملغ / كغ .

استيراد شركة التنمية الزراعية
Attanmiah Agricultural Co.
ممشق هاتف: ٤٤٤٤٥٣ - حماه هاتف: ٤٤٨٨١٨٠
حلب هاتف: ٢١١٨١٤٩ - طرطوس: ٣٢١٢١٠
website: www.attanmiah.com
e-mail: info@attanmiah.com

العبوة : ٥٠٠ x ٢٠ مل
تاريخ الإنتاج :
تاريخ إنتهاء الصلاحية : سنتان من تاريخ الإنتاج
رقم الدفعة :
Pack : 20x500ml
Pro. Date :
Expiry Date : 2 years from the pro. date
Batch No. :

الشركة المنتجة و البلد :
باير كروب ساينس - فرنسا
Bayer

SY84065110A

Article-Nr.84099333

Bayer

www.bayercropscience.de