

مانكوزيب أغريا Mancozeb Agria 800 WP مبيد فطري وقائي

الاسم التجاري: مانكوزيب أغريا.

الشكل: بودرة قابلة للبلل في الماء.

المادة الفعالة ونسبتها: ٨٠٠ غ/كغ مانكوزيب.

الاسم الكيميائي:

Chemical Name: Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (IUPAC)

Chemical Group: Dithiocarbamate

الجموع الكيميائية:

خصائص المادة: مانكوزيب ٨٠ مبيد فطري وقائي يعمل بالملاسة يستخدم وقائياً ضد مجموعة كبيرة من الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الحقلية، الأشجار المثمرة، الخضراوات ونباتات الزينة، حيث يعمل على وقاية هذه المحاصيل من الأمراض الفطرية ولفترة تصل حتى ١٥ يوم.

نصائح ومعدلات الاستخدام: يجب دائماً استخدام محلول رش مانكوزيب مباشرة بعد تحضيره كما أن المادة تستخدم خلال جميع مراحل نمو المحاصيل.

المحصول	المسرى	معدلات الاستخدام
التفاح	جرب التفاح	٢٠٠ - ٣٠٠ غ/١٠٠ لتر ماء
اللوزيات	تجدد أوراق الدراق	٢٠٠ - ٣٠٠ غ/١٠٠ لتر ماء
	التثقب الخردقي	
الكرمة	البياض الزغبي	٢٠٠ - ٣٠٠ غ/١٠٠ لتر ماء
البطاطا	اللفحة المبكرة والمتأخرة	٢٠٠ غ/١٠٠ لتر ماء
البندورة	اللفحة المبكرة والمتأخرة	٢٠٠ غ/١٠٠ لتر ماء
	تبقعات الأوراق والأنتراكنوز	
البصل	البياض الزغبي	٢٠٠ غ/١٠٠ لتر ماء
القرعيات	البياض الزغبي	٢٠٠ غ/١٠٠ لتر ماء
التبغ	العفن الأزرق	

في المشتل ٨٥-١٣٠ غ/١٠٠ لتر ماء ترش النباتات كل ٣-٤ أيام.

في الحقل ١٧٥-١٠٠ لتر ماء مرتين أسبوعياً عندما تكون الظروف مشجعة للإصابة.

السمية النباتية: لا يوجد للمبيد أي أعراض سمية على المحاصيل المذكورة عند مراعاة جميع نصائح ومعدلات الاستخدام المنصوص بها على لصاقة المبيد.

قابلية الخلط: - مانكوزيب ٨٠ يقبل الخلط مع معظم المبيدات شائعة الاستخدام وحتى مع المواد اللاصقة. - يجب عدم خلط المادة مع المركبات القلوية مثل مزيج بودرو.

فترة ما قبل الحني: ٢١ يوم على كافة المحاصيل.

المبيد غير سام نسبياً للطيور والنحل، متوسط السمية للأسماك.

السمية: الجرعة النصفية القاتلة للجرذ: LD 50 عن طريق الفم < ٢٠٠٠ ملغ/كغ من وزن الجسم الحي.

LD 50 عن طريق الجلد < ٢٠٠٠ ملغ/كغ من وزن الجسم الحي.

التصنيف السمي حسب WHO: III + من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوص بها.

الإسعافات الأولية: - في حال تلوث الجلد تزال الألبسة الملوثة ويغسل مكان التلوث مباشرة بالماء والصابون ويستدعى الطبيب إذا ظهرت علامات مرضية.

- في حال تلوث العينون تغسل مباشرة بالماء النظيف لمدة ١٥ دقيقة ويستدعى الطبيب إذا استمرت أعراض التلوث.

- في حال ابتلاع الماء الاتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات السمية في محافظتكم، لا تُعرض على الإقياء وإنما استدعي الطبيب مباشرة.

■ **في حال حدوث تسمم الاتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات السمية في محافظتكم.**

اتلاف العبوات:

١- اغسل العبوة ثلاث مرات بالماء التنظيف واضف ماء الغسيل إلى خزان الرش.

٢- تخلص من العبوات الفارغة بتقطيعها ودفنها في مكان مخصص بعيداً عن مصادر المياه الجوفية.

٣- لا تستخدم العبوات الفارغة لأي غرض كان.

٤- احفظ بقايا المبيد غير المستعمل في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق في مكان أمين بعيداً عن متناول الأطفال والمواد الغذائية والأعلاف.

الاحتياطات العامة: - عند تناول المادة تجنب ملامسة محلول الرش للجلد والعيون والملابس، وتجنب استنشاق رذاذ الرش كما تجنب أيضاً الأكل والشرب والتدخين أثناء الرش.

- بعد الانتهاء من الرش اغسل الأيدي والوجه بكثير من الماء والصابون.

الترزين والصلاحيات: - يجب حفظ المادة في عبواتها الأصلية في مكان جاف وبارد وجيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والطاقات.

- تحفظ العبوات الأصلية محكمة الإغلاق بعيداً عن أماكن الأغذية وعلف الحيوانات وبعيداً عن متناول الأطفال.

■ المادة ثابتة لمدة ثلاث سنوات عند مراعاة ظروف الترزين الجيدة المذكورة سابقاً (عبوات مختومة مخزنة في حرارة عادية وفي مكان جاف).

■ المادة سريعة التشكك في الوسط المائي وفي الوسط الحامضي وكذلك تحت أشعة الشمس.

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت رقم ٢٢/١٧ أمراض تاريخ ٢٠٠٦/٧/٥

اعتمدت للصفاة بمديرية وقاية النبات تحت رقم F/57/12 تاريخ ٢٠٠٩/١٠/٤

PACK: 10 X 1 KG

BATCH NO.:

PRODUCTION DATE:

EXPIRY DATE: 3 YEARS FROM PRO. DATE

تاريخ انتهاء الصلاحيات: ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج

إنتاج شركة أغريا - بلغاريا

PRODUCER: AGRIA S.A - BULGARIA

استيراد شركة التسمية الزراعية

دمشق هـ: ٤٤٤٤٢٥٣ - حماه هـ: ٤٨٨٦٨٠ - حلب هـ: ٢٢٧٩٥٥٠ - طرطوس: ٢٢٦٢١٠

Website: www.attanmiah.com E-Mail: info@attanmiah.com

