



750 WG
NATIVO

SY80237006A



750 WG
NATIVO
ناتيفو
٧٥٠ حبيبات قابلة للانتشار في الماء

الخصائص البيولوجية :
ناتيفو : مبيد فطري جهازى واسع الطيف ذو تأثير وقائى و علاجي يستخدم لمكافحة مجموعة كبيرة من الأمراض الفطرية على الخضراوات (زراعات محمية - مكشوفة) - الحاصل - الأشجار المثمرة و نباتات الزينة.
مميزات المبيد :
- مبيد جهازى جديد يتكون من مادتين فعالتين لكل واحدة طريقة تأثير مختلفة عن الأخرى.
- تيبوكونازول مبيد فطري يتبع مجموعة التريازول ذات الصفات الجهازية و التي تقضي على الفطر عن طريق تثبيط تخليق السيترول في الخلايا الفطرية.
- ترايفلوكسي ستروبرين مبيد فطري باللامسة و له صفات جهازية موضعية يذوب و يخترق الطبقة الشمعية لأوراق النبات و يثبط عمل الميتوكوندريا المسؤولة عن التنفس في الفطريات.
- وقائى و علاجي يتميز بسرعة تأثيره و طول فترة فعاليته.
- آمن على الحاصل المنصوح باستخدامه عليها.
- آمن على البيئة و المتطفلات و المفترسات النافعة و غير ضار بالحل.
- آمن على الحشرات النافعة و النحل.
- فعالية ممتازة على مجموعة كبيرة من الأمراض الفطرية بما فيها البياض الدقيقي . الجرب . أنثراكنوز و تبقعات الأوراق.
نصائح الاستخدام :

الحصول	الأمراض	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الجني
التفاح	البياض الدقيقي جرب التفاح	٣٠ غ لكل ١٠٠ لتر ماء	٧ أيام على التفاحيات و اللوزيات
اللوزيات	البياض الدقيقي لفحة مونييا	٣٠ غ لكل ١٠٠ لتر ماء	
العنب	البياض الدقيقي	٢٠ غ لكل ١٠٠ لتر ماء	١٤ يوم على العنب
الفرعيات	البياض الدقيقي	٤٠٠ غ لكل ١٠٠ لتر ماء ٣٥ غ لكل ١٠٠ لتر ماء الإعتماد المحلي	٣ أيام على الخيار لمكافحة البياض الدقيقي على الخيار
البندورة	البياض الدقيقي تبقعات الأوراق	٤٠ غ لكل ١٠٠ لتر ماء	٧ أيام على البندورة
المشوف والزهرة	لفحة الترنابرا - التبقع الحلقى البياض الدقيقي - تبقع الأوراق	٤٠ غ لكل ١٠٠ لتر ماء	٢١ يوم على المشوف الزهرة والجزر
الجزر	لفحة الترنابرا عفن سكليريدينيا البياض الدقيقي	٣٠ غ لكل ١٠٠ لتر ماء	



750 WG
NATIVO
ناتيفو
٧٥٠ حبيبات قابلة للانتشار في الماء

توقيت الرش :
للحصول على أفضل النتائج في مكافحة الأمراض يجب رش المبيد ناتيفو عند بداية الإصابة و قبل إنتشارها في الحقل و يجب أيضا ضبط محلول الرش الذي يؤمن تغطية كاملة للنباتات المعاملة.
قابلية الخلط :
ناتيفو قابل للخلط مع مجموعة كبيرة من المبيدات الأخرى و لكن و بشكل عام يجب دائما التأكد من قابلية الخلط على عيوات المبيدات المراد خلطها مع بعضها و جربة أي مزيج على نطاق ضيق قبل تعميم الرش على كامل الحقل.
السمية النباتية :
لا يوجد للمبيد أي أعراض سمية على الحاصل المنصوح باستخدامه عليها عند مراعاة نصائح و معدلات الاستخدام
معلومات السمية :
الجرعة التوصية للقattle للجره :
LD50 عن طريق الفم : ٥٠٠٠ ملغ /كغ من وزن الجسم الحي للمستحضر التجاري
LD50 عن طريق الجلد : ٢٠٠٠ ملغ /كغ من وزن الجسم الحي للمستحضر التجاري
المبيد غير سام للحل - قليل السمية للطيور

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
حُت رقم ٧٣١/ أمراض تاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٩
إعتمدت الصلابة بمصرية وقاية النبات حُت رقم F/73/1 تاريخ ٢٠١١/١٢/١١



750 WG
NATIVO
ناتيفو
٧٥٠ حبيبات قابلة للانتشار في الماء

١٠٠ غم صافي 100g net

مبيد فطري جهازى

اسم المنتج: باير كروب ساينس - ألمانيا
للأدارة الشفاعة:
Active ingredients
Trifloxystrobin 250g/kg
Tebuconazole 500g/kg
Chemical group:
strobilurin
Triazole
تري فلوكسي ستروبرين ٢٥٠ غ/كغ
تسيوكونازول ٥٠٠ غ/كغ
المجموعة الكيميائية
تري فلوكسي ستروبرين من مجموعة ستروبيلاورين
تسيوكونازول من مجموعة تريازول

الاسم الكيميائي حسب IUPAC
Trifloxystrobin : methyl (E)-methoxymino-[(E)- α -[1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminoxy]-o-tolyl)] Acetate
Tebuconazole: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1, 2,4-triazol-1-ylmethyl)Pentan-3-ol
التصنيف السمي حسب WHO : II+
من غير المحتمل حدوث تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها

استبدار شركة التنمية الزراعية
Attanmiah Agricultural Co.
دمشق هاتف : ٤٤٤٢٥٣ - جواه هاتف : ٤٤٨٨٨٠
حلب هاتف : ٢٢٧٤٥٠ - طرطوس : ٢٢١٢١٠
website: www.attanmiah.com
e-mail: info@attanmiah.com

الشركة المنتجة والبذل :
Bayer CropScience AG
Germany
باير كروب ساينس - ألمانيا



750 WG
NATIVO
ناتيفو
٧٥٠ حبيبات قابلة للانتشار في الماء

الإسعافات الأولية :
- في حال ملامسة المبيد للجلد يجب الغسل فوراً بالماء و الصابون
- في حال بلوت العينين : تغسل مباشرة بكمية وافرة من الماء (١٥ - ٢٠ دقيقة) ثم تراجع الطبيب
- في حال الإستنشاق : ينقل المصاب إلى منطقة ذات هواء نظيف. إذا توقف التنفس يجرى تنفس إسعافي و يدفأ المصاب ثم يستدعى الطبيب.
- يجب حفظ المبيد في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق
حفظ العبوات :
- يجب حفظ المبيد في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق بعيداً عن أماكن الأغذية و علف الحيوانات و بعيداً عن تناول الأطفال
الاحتياطات :
- المبيد سام في حال الإتلاع
- تجنب ملامسة المبيد للعين والجلد
- يجب عدم تناول الطعام و الشراب أو التدخين أثناء عملية الرش
- في حال الإصابة ، اتصل بالطبيب فوراً و إتبع التعليمات الموجودة في الصلابة .
- في حال حدوث أي تسمم الإتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات السمية في محافظتكم.
إتلاف العبوات :
١. اغسل العبوة ثلاث مرات بالماء النظيف و أضف ماء الغسيل إلى خزان الرش
٢. تخلّص من العبوات الفارغة بتقطيعها و دفنها في مكان مخصص بعيداً عن مصادر المياه الجوفية
٣. لا تستخدم العبوات الفارغة لأي غرض كان
٤. احتفظ بقايا المبيد غير المستعمل في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال و المواد الغذائية و الأعلاف
العبوة : ١٠٠ غ
تاريخ الإنتاج :
Production Date :
تاريخ إنتهاء الصلاحية : سنتان من تاريخ الإنتاج
Expiry Date : 2 years from production date
Batch No. :
رقم الدفعة :

Bayer

Bayer CropScience Cyprus Office	Created by : A. Mahmoud
	Code Files for Server : 80237006A
Date : 24.10.2014 Dimensions: 90X55x130 mm	File reference : SY.80237006A(90x55x130mm)
	Loaded by: A. Mahmoud
Finish - File	Illustrator CS6 CMYK