

Nando 50% SC



ناندو

٥٠٪ معلق مركز

مبيد فطري جديد



Caution



اسم المنتج: نيوفارم - بريطانيا Nufarm - united Kingdom

الاسم التجاري والشكل: ناندو - معلق مركز

المادة الفعالة: فلوازينام ٥٠٠ غ/لتر 500 G/L Fluazinam

Chemical Name: (IUPAC):

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)- ٤. ٤. ٤-trifluoro-2.6-

dinitro-P-toluidine

Chemical class: Phenyl-Pyridinamine

المجموعة الكيميائية: ناندو مبيد فطري يعمل بالملامسة ويؤثر في الفطر في مواقع متعددة يستخدم للوقاية من مجموعة من الأمراض الفطرية مثل الفطحات على البطاطا والخضراوات والبيض الزغبي على الخضراوات والعنب و جرب التفاح. **معدلات الاستخدام:**

المحصول	المرض	معدل الاستخدام	فترة ما قبل الجني
البطاطا	اللفحة المتأخرة Phytophthora infestans	٢٠٠-٤٠٠ مل / هكتار	٧ أيام
البندورة	العفن الرمادي Botrytis Cinerea واللفحة المتأخرة Phytophthora infestans	٧٥٠ مل / هكتار ٤٠٠ مل / هكتار	١٤ يوم
العنب	البيض الزغبي Plasmopara Viticola والعفن الرمادي Botrytis Cinerea	١٥٠٠ مل / هكتار	٢١ يوم
التفاح	جرب التفاح Venturia inaequalis	٤٠٠ - ١٠٠٠ مل / هكتار	٢١ يوم

الاعتماد المحلي: على البندورة والبطاطا لمكافحة اللفحة المتأخرة بشكل وقائي بمعدل ٤٠٠ ل/هـ.

للحصول على أفضل النتائج يجب إجراء الرش عندما تكون الظروف الجوية مشجعة لتطور المرض أو عند ظهور أولى علامات المرض ويكرر الرش حسب تطور المرض.

طريقة تأخير المبيد: - إن المادة الفعالة تؤثر في الفطر في مواقع متعددة ويظهر تأثيرها خلال دورة حياة الفطر في عدة مراحل فهي تمنع إنبات الأبواغ كما أنها تمنع الخيوط الفطرية من اختراق أنسجة النبات وكذلك فهي توقف عملية إنتاج الأبواغ. - بسبب تعدد مواقع التأثير فإنه من المستبعد تشكل سلالات مقاومة لهذا المبيد.

تحمل المحاصيل: تتحمل معظم المحاصيل المبيد دون أية حساسية شريطة مراعاة كافة نصائح ومعدلات الاستخدام.

قابلية الخلط: - يجب عدم خلط المبيد مع الزيوت أو مع المركبات القلوية أو مع المبيدات الفطرية التي مادتها الفعالة (dodine) وبشكل عام فإنه عند تحضير أي مزيج ينصح بتجربة المزيج على مجموعة صغيرة من النباتات قبل رش الحقل بالكامل. - المنتج والمستورد لا يتحملان أية مسؤولية ناتجة عن سوء خلط واستخدام المبيد.



السمية: الجرعة التصفية القاتلة للجرذ:

LD50 عن طريق الفم أكثر من ٢٠٠٠ ملغ / كغ.

LD50 عن طريق الجلد أكثر من ٢٠٠٠ ملغ / كغ.

التصنيف السمي حسب WHO: III: خفيف السمية.

- المبيد عالي السمية على الأحياء المائية. - خفيف السمية للنحل والطيور.

احتياطات الاستخدام: - تجنب ملامسة المبيد للجلد. - يجب ارتداء الألبسة الواقية اللازمة عند استخدام المبيد. - بعد الانتهاء من الرش يجب غسل كافة الألبسة وبشكل جيد قبل إعادة استعمالها. - يجب إجراء الرش في ظروف جيدة وتجنب الرش في حال وجود الريح. - تجنب (الاكل، الشرب، التدخين) أثناء القيام بعملية الرش. - لا تلوث مصادر المياه.

التخزين: احفظ المبيد في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق وفي مكان جاف وبارد جيد التهوية بعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن أماكن الأغذية وعلف الحيوانات.

الإسعافات الأولية: - في حال تلوث الجلد: يجب إزالة الألبسة الملوثة وغسل الجلد بكثير من الماء والصابون. - في حال تلوث العيون: اغسل مباشرة وبكمية كبيرة من الماء ولمدة ١٥ دقيقة وفي حال استمرار الأعراض يجب استشارة الطبيب. - في حال الابتلاع: يجب غسل القم بالماء، لا تحرض على الإقياء وإنما استدعي الطبيب وأعرض عليه لصفاة المبيد. - لا يوجد مضاد تسمم خاص وإنما تعالج الأعراض.

في حال حدوث أي تسمم يجب الاتصال بأقرب مركز وطني للمعلومات السمية في محافظتكم. **إتلاف العبوات:** - اغسل العبوة ثلاث مرات بالماء النظيف وأضف ماء الغسيل إلى خزان الرش. - تخلص من العبوات الفارغة بعد تقطيعها ودفعها في مكان مخصص بعيداً عن مصادر المياه الجوفية. - لاستخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان. - احفظ بقايا المبيد غير المستعمل في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق في مكان أمين بعيداً عن متناول الأطفال والمواد الغذائية وعلف الحيوانات.

العبوة: ٥، ١٠ لتر Pack: 0.5 L

رقم الدفعة: انظر أعلى العبوة Batch No.: See on pack

تاريخ الإنتاج: انظر أعلى العبوة Pro.date: See on pack

تاريخ انتهاء الصلاحية: سنتان من تاريخ الإنتاج Expiry date: 2 years from Pro.date

المادة مسجلة لدى وزارة الزراعة تحت رقم 79/1 أمراض تاريخ ٢٠١٢/١/٣

اعتمدت للصفاة بمديرية وقاية النبات تحت رقم F/87/1 تاريخ ٢٠١٤/١٠/٢١

إنتاج شركة نيوفارم - بريطانيا

استيراد شركة التنمية الزراعية

دمشق هـ ٤٤٤٤٢٥٣ - حماه هـ ٤٤٨٨٦٨٠

طرطوس هـ ٢٢٦٢١٠ - حلب هـ ٢٦٦٨١٤٩

Website: www.attanmiah.com

E-Mail: info@attanmiah.com

