

Danisaraba 20% SC

Active ingredient: Cyflumetofen 20% (WIW)

معدلات الاستخدام:

الحصول	الأسم	معدل الاستخدام في ١٠٠ لتر ماء	فترة ما قبل الحصد
التفاح	التنكوت الأحمر Tetranychus urticae التنكوت ذو البطنين	١٠٠ مل	١ يوم
الحماضيات	تنكوت الحمضيات الأحمر Phyllocoptruta Oleivora حلم صم الحماضيات	١٠٠ - ٢٠٠ مل	١ يوم
البنسورة - الفليفلة البيالاجان	التنكوت الأحمر Tetranychus urticae التنكوت ذو البطنين	١٠٠ مل	١ يوم
الشربعات	التنكوت الأحمر Tetranychus urticae التنكوت ذو البطنين	١٠٠ مل	١ يوم
الطربوز	التنكوت الأحمر Tetranychus urticae التنكوت ذو البطنين	١٠٠ مل	١ يوم
نباتات الزينة	التنكوت الأحمر Tetranychus urticae التنكوت ذو البطنين	١٠٠ مل	

• الاعتماد المحلي لمكافحة عناكب التفاح والخيار والكوسا بمعدل ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء.

السمية النباتية:

لا يوجد للمبيد أي سمية نباتية على المحاصيل المذكورة في الجدول عند مراعاة كافة نصائح ومعدلات الاستخدام.

قابلية الخلط:

غير قابل للخلط مع المبيدات القلوية ولا يوجد نصائح للخلط مع المبيدات الأخرى.

الخرن:

يجب حفظ المبيد في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق وفي مكان جاف وبارد، بعيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن أماكن الأغذية وعلف الحيوانات وبعيداً عن متناول الأطفال.



دانييسارابا ٢٠٪

مبيد عناكبي جديد



المادة الفعالة: سيفلوميثوفين ٢٠٪ (وزن / وزن)

المجموعة الكيميائية: Benzoylacetonitrile

خصائص المبيد:

- **دانييسارابا** مبيد عناكب جديد ينتمي لمجموعة بنزويل أسيتونيترايل ويتمتع بفعالية عالية لمكافحة أنواع العناكب الضارة على الأشجار المثمرة والحدائق ونباتات الزينة.
- **دانييسارابا** يمتلك تركيبة كيميائية فريدة وجديدة وطريقة تأثير مختلفة عن المبيدات الأخرى ولذلك فهو يتمتع بفعالية عالية تجمع سرعة التأثير خلال ساعات من الرش وطول فترة الفعالية تصل حتى ٢٨ يوم على أنواع العناكب بما فيها تلك السلالات التي شكلت مقاومة للمبيدات الأخرى.
- **دانييسارابا** يكافح العناكب بكافة أطوارها (بويضات - حوريات - بالغات) وفعالته غير مرتبطة بدرجات الحرارة أو أية ظروف أخرى في الحقل.
- **دانييسارابا** آمن على الأعداء الحيوية والحشرات النافعة.

طريقة التأثير:

يؤثر بالملامسة بطريقة جديدة وفريدة ومختلفة عن كل مبيدات العناكب الأخرى من حيث موقع التأثير. حيث أن المادة الفعالة تعمل على منع انتقال الإكترونات في الميتوكوندريا في الموقع II وينتج عن ذلك وقف إنتاج الطاقة ما يؤدي إلى شلل العناكب وموتها سريعاً. وتبدو العناكب الميتة في وضعيتها المعتادة لفترة من الوقت قبل أن تسقط عن الأوراق.



استيراد شركة التنمية الزراعية

دمشق هـ ١٤٤٣ - حماد هـ ١٤٤٦
حلب هـ ٢٢٧٩٥٥ - طرابلس هـ ٢٢٦٩١٠
E-Mail: info@attanmiah.com
Website: www.attanmiah.com

انتاج شركة

OAT Agrio Co., Ltd.
OAT Agrio Co. Ltd - JAPAN



جديد شركة التنمية الزراعية مبيد العناكب دانييسارابا